

А. Д. ШАРОНОВ

## НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ ПТИЦ В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(Представлено академиком Е. Н. Павловским 16 IV 1951)

В течение ряда лет я проводил исследования фауны птиц в таежной зоне Западной Сибири. Всего совершено пять летних поездок преимущественно в пределы Сургутского района Тюменской обл., в результате которых установлено гнездование 140 видов; кроме того, значительно уточнены границы ареалов некоторых форм.

*Falco rusticolus uralensis* (Sev. et Menzb.) — кречет. Сведений о гнездовании этой формы в литературе нет. 9 августа 1937 г., в районе среднего течения р. Торм-Яун (около 62° с. ш.) я наблюдал еще не разбившуюся семью кречетов, состоявшую из пяти особей. Хищники дважды пролетели низко над палаткой, не обнаруживая никакой боязни. Молодой самец был добыт. Вероятно, кречеты наблюдались в пределах гнездового района.

*Erythropus vespertinus* (L.) — кобчик. Наблюдался в районе Сургута в небольшом числе, но прослежен до низовьев Агана. Держались кобчики по лесным островкам речных пойм. 20 июля был добыт самец в переходном наряде из первого во второй. Зоб и желудок были наполнены исключительно насекомыми, преимущественно стрекозами.

*Aquila clanga* Pall. — большой подорлик. Довольно обычная гнездящаяся птица по крайней мере до 63° с. ш., по р. Торм-Яун. В середине июля 1947 г. недалеко от Сургута я нашел гнездо, расположенное на высоком кедре, с единственным птенцом, уже довольно крупным, с начавшими отрастать маховыми. Старые птицы носили ему уток и погонышей, очень многочисленных на обских лугах. Сведений о гнездовании подорлика северней Тобольска не имелось.

*Porzana pusilla* (Pall.) — курочка-крошка. Мною добыта около Сургута самка в период кладки, судя по очень сильно развитому яичнику. В пределах Сибири не была известна севернее Омска и Томска (!).

*Streptopelia orientalis* (Lath.) — большая горлица. В Западной Сибири была известна к северу лишь до Тобольска и Нарыма. Я наблюдал и добыл самца и самку 18 июля близ Сургута, среди вырубки, поросшей в изобилии бузиной, молодыми елями и пихтами. Судя по состоянию гонад, это была гнездящаяся пара.

*Erolia subminuta* (Midd.) — длиннопалый песочник. Находки этого вида вообще очень редки. Достоверных сведений о местах гнездования очень мало. Мною эти кулички несколько раз наблюдались около Сургута, на небольшом участке мокрого луга, небольшими стайками, не более 10 особей. Почти все добытые экземпляры не обнаруживали признаков гнездования. Только в последних числах июня 1947 г. удалось добыть самку с очень крупными желтками в яичнике. На этом основании,

а также судя по тревожному поведению кулика, можно считать достоверно установленными единичные случаи гнездования длиннопалого пестрика в районе Сургута.

*Larus argentatus antelius* Iredale — серебристая чайка. В пределах Западной Сибири было известно гнездование этого вида в низовьях рек Оби, Таза, Надыма и на побережье Ледовитого океана. Мною найден на гнездовье в Сургутском районе в огромном количестве.

*Sterna paradisaea* Pontopp.— полярная крачка. В Западной Сибири гнездование этой птицы не было известно южнее полярного круга. Я нашел значительные колонии на водораздельных озерах несколько севернее Сургута (нижнее течение р. Торм-Яун). В первых числах августа мною наблюдалась самка, кормившая мелкой рыбешкой птенца, который временами следовал за матерью, летавшей над рекой. Обе птицы были добыты.

*Apus apus apus* (L.) — черный стриж. Этот вид севернее Тобольска не был известен. Мною прослежено гнездование стрижа к северу до 63° с. ш. Гнездится исключительно в дуплах деревьев, не обнаруживая никакой привязанности к постройкам человека. Улетает из района Сургута в середине августа.

*Caprimulgus europaeus* L.— козодой. Наблюдался единичный экземпляр этого вида в ночь на 12 августа 1947 г. Гнездование не установлено. В районе Тобольска является гнездящейся птицей.

*Oriolus oriolus oriolus* (L.) — иволга. Севернее Тобольска никем не была указана. Я наблюдал ее в небольшом количестве в окрестностях Сургута в гнездовое время. Иволги держались по опушкам смешанных лесов или в небольших лесных островках в пойме Оби.

*Uragus sibiricus* (Pall.) — длиннохвостый снегирь. До сих пор ближе Томска и Енисейска не был известен (2). Мною длиннохвостые снегيري найдены только в низовье Югана 1 августа 1947 г. Птицы держались в зарослях черемухи и ивняков в прирусловой части поймы. Самцы изредка пели. Добыты четыре самца, одна самка и один птенец, уже покинувший гнездо. В зобу у них обнаружены семена травянистых растений.

*Pinicola enucleator stschur* Port.— щур. Не встречались южнее 62° с. ш. Указание Г. П. Дементьева (2) на гнездование щура к югу до Тюмени, несомненно, ошибочно. Эти птицы в большом количестве наблюдались в борах-беломошниках, где они кормились брусникой. Добытые 4 августа молодые самцы находились в состоянии интенсивной линьки во взрослый наряд.

*Fringilla coelebs coelebs* L.— зяблик. Единичная находка зяблика известна на Оби около 63° с. ш. и в пределах лесного Урала около 64° с. ш., но гнездование севернее Тобольска не было установлено. В окрестностях Сургута, главным образом в смешанном лесу Каменного Мыса, на левом берегу Оби, зяблик обыкновенен; на правом берегу встречается значительно реже. В конце июля 1947 г. я нашел гнездо с тремя свежими яйцами; оно почему-то было брошено птицами.

*Anthus hodgsoni inopinatus* Hart. et Steinb.— конек зеленый. В Западной Сибири была известна единичная находка этого вида на Казыме. В посещенном мною районе гнездится в большом количестве. В 1949 г. я нашел его в значительном числе в низовье р. Демьянки. В районе Тобольска не найден. На запад этот конек распространен до Северного Урала, где впервые был указан (3).

*Bombicilla garrulus* (L.) — свистель. Южная граница гнездовья этого вида в Западной Сибири никем не указывалась. Я нашел свистеля в качестве многочисленной гнездящейся птицы в районе Сургута. В начале июля наблюдались молодые, едва начинавшие летать. Вероятно, гнездится и южнее Сургута. В середине июля 1949 г. я наблюдал большое количество свистелей в низовье Демьянки, но это были

исключительно взрослые особи. Все добытые экземпляры оказались самцами с довольно крупными гонадами.

*Phylloscopus inornatus inornatus* (Blyth.) — пеночка-зарничка. Для Тобольского Севера до сих пор была известна лишь единичная находка. Мною в районе Сургута и нижнего течения р. Торм-Яун найдена в большом количестве. В середине июля я наблюдал еще не разбившиеся семейки, которые держались преимущественно в густых кедровых лесах. Добыто около десяти экземпляров.

*Phylloscopus nitidus viridanus* Blyth.—зеленая пеночка. Найдена в качестве гнездящейся птицы в значительном количестве к северу до 63° с. ш. Вероятно, распространена и севернее. До сих пор не была указана севернее Тобольска.

*Locustella certhiola sparsimstriata* Meiss.—сверчок Палласа. Этот вид считался почти исключительно восточносибирским (заенисейским) и западнее Томска и Барнаула не был известен. В районе Сургута мною найден на гнездовье в большом количестве. Незатейливая песня этих птиц всюду была слышна среди обширных высокотравных лугов и мелких кустарников в пойме Оби. В 1941 г., когда разлив Оби был необычайно велик и вся пойма была затоплена, много сверчков наблюдалось на припойменных болотах, поросших низкорослыми сосенками и багульником.

*Agrocephalus dumetorum* Blyth.—садовая камышевка. Северная граница этого вида не была известна. В районе Сургута гнездится в большом количестве, придерживаясь преимущественно кустарников и густых подлесков на окраинах леса.

*Tarsiger cyanurus* (Pall.) — синехвостка. В районе Сургута и по р. Торм-Яун — многочисленный гнездящийся вид. Населяет густые участки хвойного леса близ поймы. Молодые в большом количестве наблюдались в ивняках. На р. Демьянке мною не найден. Под Тобольском известен только на пролете (4).

*Luscinia calliope calliope* (Pall.) — соловей-красношейка. В небольшом количестве гнездится в припойменных участках леса. Я наблюдал красношеек как по р. Торм-Яун, так и в низовьях Югана. Южная граница этого вида в Западной Сибири не установлена. Для района Тобольска не указывается, не найден мною и на Демьянке.

*Saxicola rubetra* (L.) — луговой чекан. В Западной Сибири севернее Тобольска никем не указан. В районе Сургута я нашел этого чекана в небольшом количестве на гнездовье. Встречались чеканы на вырубках и на пустырях, поросших местами крапивой и другими сорняками.

Тюменский государственный  
педагогический институт

Поступило  
28 III 1951

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> С. А. Бутурлин и Г. П. Дементьев, Полный определитель птиц СССР, 2, 1935. <sup>2</sup> С. А. Бутурлин и Г. П. Дементьев, там же, 4, 1937.  
<sup>3</sup> Л. А. Портенко, Фауна птиц внеполярной части Северного Урала, 1937.  
<sup>4</sup> М. П. Тарунин, *Uragus*, № 3—4 (1928).