

П. П. ТАРАСОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СУРКОВ
В ЮЖНОЙ СИБИРИ И СМЕЖНЫХ ЧАСТЯХ МОНГОЛИИ

(Представлено академиком Е. Н. Павловским 27 IX 1952)

1. О сурках Алтая, Западной Монголии и Тувы. Важное промысловое значение сурков и особая роль их в эпидемиологии опасных инфекций заслуженно ставят этих грызунов в число первоочередных объектов изучения. Между тем, до сих пор нет достаточной ясности не только в вопросах распространения сурков, но для ряда районов остается невыясненной их систематическая принадлежность.

Долго считалось⁽⁴⁾, что весь Алтай заселен алтайским сурком (*Marmota baibacina* Kast.). Позднее ряд исследователей^(1, 3, 5, 6) утверждал, что на Алтае, кроме названного вида, по крайней мере в Чуйской степи, обитает еще и монгольский сурок (*Marmota sibirica* Radde). Другие исследователи в более позднее время^(7, 9) пришли к выводу, что в районе Чуйской степи обитает не тарбаган, но алтайский сурок, однако при этом ни один из авторов не отрицал наличия, хотя бы для восточной части Чуйской степи, и тарбагана.

Неясность вопроса о видовой принадлежности сурков, населяющих Алтай, естественно затрудняла решение вопроса, какие из этих видов обитают в смежных областях: в Туве⁽¹²⁾ и Западной Монголии⁽¹⁰⁾.

В 1947 г. мне представился случай коллектировать в Западной Монголии сурков, просматривать их шкуры у охотников и в заготовительных организациях. Стало совершенно ясным, что западная окраина Монгольской Народной Республики, в пределах всего Баян-Ульгейского аймака, населена одним видом сурка — именно алтайским сурком (*Marmota baibacina* Kast.) и что границей распространения этого сурка в северной части ареала является долина р. Бухэй-Мурен и котловина оз. Ачит-Нур.

Далее на юг граница идет по линии: Ачит-Нур — Делюн-Сомон (верховья р. Буянту). Здесь, в условиях сложного горного рельефа, на равном примерно расстоянии от Делюн-Сомона до г. Кобдо и происходит стык ареалов данного сурка с тарбаганом.

Следовательно, алтайский сурок населяет всю монгольскую часть Сайлюгема, Монгольский Алтай (по крайней мере до верховий Булугуна) и все промежуточные хребты, заключенные в треугольнике между Сайлюгемом, Монгольским Алтаем и линией Ачит-Нур — Делюн-Сомон.

Поскольку ареал тарбагана со стороны Монголии простирается на запад в его северной части не далее хребтов Хархира и Байрим (по Г. Н. Потанину, «Бармен»⁽⁸⁾), естественно было предполагать, что его не должно быть в районе Чуйской степи. Проверка данного вопроса на Алтае подтвердила правильность этого предположения. По всему Сайлюгему и его предгорьям, окаймляющим с юга Чуйскую степь (в которой

сурков из-за пустынного характера растительности нет вообще), встречался только алтайский сурок.

Далее выяснилось, что только эти сурки населяют хребет Чихачева, они же заходят и в Туву, где были прослежены на 15 км от ее границы к востоку. По свидетельству охотников в Мангун-Тайгинском районе Тувы границей между ареалами тарбагана и алтайского сурка является все та же долина р. Бухэй-Мурен.

Таким образом, становится ясным, что на территории Алтая обитает не два вида сурков, как это до сих пор считалось, а только один вид — алтайский сурок. Напротив, в Тувинской обл. встречаются оба вида — алтайский и монгольский.

2. О реликтовой колонии тарбаганов в Чикойской тайге. Считалось, что тарбаган заходит в пределы СССР лишь там, где степные биотопы Сибири непосредственно смыкаются со степями Монголии (Забайкалье, Тува, Алтай). При этом полагали, что между популяцией тарбаганов, населяющих Восточное Забайкалье, и популяцией Западного Забайкалья существует разрыв в несколько сот километров, обусловленный наличием здесь сплошной горной тайги (2, 11).

Посетив осенью 1950 г. мало доступную и совершенно неизученную область от р. Кыры (левый приток Онона, системы Амура) до р. Мензы (левый приток Чикоя, системы Селенги) и пройдя далее вниз по этой реке до ее устья, я выяснил, что по долине Мензы, близ пересечения ею государственной границы, имеется крупный, до сих пор остававшийся неизвестным очаг обитания тарбаганов.

Обнаружение этого очага тем более интересно, что многочисленные отдельные поселения тарбаганов в нем растянулись вдоль Мензы, только в пределах Советского Союза, больше чем на 50 км, а общая численность зверков в очаге достигает, по свидетельству местного населения, свыше тысячи голов.

Тарбаганы населяют здесь так называемые «убуры», т. е. остепненные южные, обычно крутые склоны гор, замыкающих неширокую долину Мензы и приустьевую часть ее притоков. Ныне эти участки разобщены и представляют собой отдельные пятна безлесной растительности, размером до нескольких гектаров.

Большая часть таких остепненных участков, даже самых небольших, занимающих площадь всего в $\frac{1}{4}$ га, заселена тарбаганами, причем некоторые из них, например по Менжикену, отделены лесом от ближайшего такого же поселения на десяток и более километров. По самым скромным подсчетам таких разрозненных поселений насчитывается здесь до 30.

Наиболее густо отдельные поселения зверков сконцентрированы в окрестностях с. Укыр, где они длинной цепью вытянулись по р. Батухану, по правобережью р. Хацуры и левобережью р. Хара-Дель. Заметим, что на монгольской части долины Мензы, где остепненные участки более широки, численность тарбаганов, по свидетельству местного населения, значительно выше.

Интересна и сама по себе история здешней популяции сурков (вернее, ряда обособленных популяций), поскольку долина Мензы, истоки которой лежат в Кэнтее, отделена от ближайших степей Монголии сплошными лесами по меньшей мере на сотню километров. Допускать при таких обстоятельствах, что здешние сурки проникли в долину Мензы путем обычного расселения, не приходится.

Естественно поэтому считать, что здешние сурки представляют не что иное, как реликт былой степной фауны, населявшей некогда эту горную страну, ныне занятую сплошь таежной зоной.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ Н. А. Бобринский, Сборн. пам. акад. Мензбира, 1937, стр. 51. ² И. П. Бром, Географическое распространение тарбагана и его численность в юго-восточном Забайкалье, Иркутск, 1945. ³ Б. С. Виноградов, А. И. Аргиропуло, Определитель грызунов, Фауна СССР, М.—Л., 1941. ⁴ Н. Ф. Кашенко, Изв. Томск. ун-та, кн. 16 (1900). ⁵ А. М. Колосов, Уч. зап. МГУ, Зоология, в. 20 (1939). ⁶ Е. М. Корзинкина, Сборн. Экология сурка, 1935. ⁷ С. И. Огнев, Звери СССР и прилежащих стран, 5, 1941. ⁸ Г. Н. Потанин, Очерки Северо-Западной Монголии, в. 1, 1881. ⁹ В. Н. Скалон, Изв. Ирк. гос. противочумн. ин-та Сибири и Дальнего Востока, 8 (1950). ¹⁰ В. Н. Скалон, А. Г. Банников, там же. ¹¹ А. С. Фетисов, там же, 2 (1935). ¹² А. И. Янушевич, Фауна позвоночных Тувинской области, Автореферат докторской диссертации, 1950.