

А. Д. ШАРОНОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ ПТИЦ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(Представлено академиком Е. Н. Павловским 9 III 1954)

Литературные сведения о распространении птиц в Западной Сибири, вследствие недостаточной изученности орнитофауны этого края все еще отличаются неполнотой. Ряд находок мною был указан ранее ⁽⁶⁾. В настоящей статье приводятся новые данные, полученные преимущественно за последние два года в результате изучения фауны птиц в районе среднего течения р. Ваха (летом 1952 г.) и в Тюменском районе. Почти весь материал по описываемым видам передан в Зоологический институт Академии наук СССР.

Chlidonias leucorhynchos (Temm.) — крачка белокрылая. Северная граница этого вида проводится по линии Челябинск — Омск — Каинск ⁽³⁾. В действительности он гнездится значительно севернее. Большие гнездовые колонии белокрылых крачек найдены мною в пойме р. Туры, в окрестностях Тюмени и на 40—50 км севернее. В середине июля молодые находились еще на гнездовых участках. Взрослые птицы носили им корм, состоявший главным образом из кузнечиков и мелкой рыбы (гольянов). Во второй половине августа крачки покидали места гнездовий.

Clangula hyemalis (L.) — морянка. Гнездовая область этого вида лежит в полярной зоне и простирается до границы лесной растительности. Южнее гнездование морянки обычно не наблюдается. 29 VI 1952 г., в 35 км к югу от Тюмени (близ д. Онохино), мною была найдена самка с четырьмя птенцами, в возрасте не более недели. Выводок держался на небольшом озерке в пойме р. Пышмы. Самка при преследовании ныряла, иногда поднималась на крыло, не улетая однако за пределы водоема. Птенцы спрятались в прибрежной траве. Самка была застрелена, а затем был пойман и один из птенцов, который, выбравшись из воды, пытался спрятаться на берегу. Описанный случай гнездования в столь южных для морянки широтах является исключительным и трудно поддается объяснению. Может быть, причина его заключается в том, что весна 1952 г. в Западной Сибири была поздняя и холодная. В первой половине мая часто шли дожди, сменявшиеся обильными снегопадами. Так, 15 мая почти весь день шел снег, покрыв землю на 15—20 см. К вечеру резко потеплело, снег стаял, а на другой день температура воздуха поднялась до 20°. Начался период жары. Возможно, что отдельные запоздалые пары морянок, задержанные неблагоприятной погодой, приступили к гнездованию далеко за пределами нормальной гнездовой области. Это тем более вероятно, что брачное оживление у морянок начинается еще на местах зимовок ⁽⁴⁾. У И. Я. Слюцова ⁽⁵⁾ описан случай, когда морянка около Тюмени была добыта 9 июня.

Asio otus (L.) — сова ушастая. Северная граница ушастой совы в Западной Сибири недостаточно известна ⁽²⁾; севернее Тюмени

гнездование не было указано. Я нашел ушастую сову в качестве гнездящейся птицы в районе Сургута. Сова была встречена 25 VI 1939 г. в пойме Оби на небольшом островке, поросшем лесом. Сначала был замечен пуховой птенец, который сидел на упавшем дереве, а через некоторое время — и взрослая самка, выдавшая себя тревожным криком. Обе птицы были добыты.

Garrulus glandarius brandtii Ever sm.—сойка рыжеголовая. Для бассейна Оби сойка указывалась ⁽¹⁾ до 61° с. ш., где, несомненно, лежит северный предел распространения этого вида. Приблизительно на той же широте я нашел сойку и в районе среднего течения р. Ваха. 28 VII 1952 г. был встречен и добыт единственный экземпляр, в состоянии сильной линьки. В районе Сургута сойка мною ни разу не встречена. В нижнем течении р. Демьянки — обычный гнездящийся вид.

Coccothraustes coccothraustes verticalis But.—дубонос. Северная граница гнездовой области дубоноса в Западной Сибири не установлена. Предположительно указывалась ⁽¹⁾ около Тюмени. Один экземпляр (взрослый самец) был добыт 6 XI 1927 г. в окрестностях Тобольска. Мною дубонос найден на гнездовье в районе среднего течения р. Ваха. В первых числах августа 1952 г. в невысоком кедровом лесу я наблюдал выводок дубоносов из 7—8 особей. Птицы кормились главным образом кедровыми орешками, извлекая их из шишек, расклеванных и брошенных ореховками. Взрослые иногда кормили птенцов. Добыто три молодых птицы. Дубонос в Западной Сибири распространен очень спорадично.

Fringilla coelebs L.—зяблик. Гнездовая область зяблика простирается к северу, по крайней мере, до линии Сургут — Ларьяк, где этот вид уже очень редок. 30 VII 1952 г. близ Ларьяка я слышал пение зяблика, а затем в тот же день нашел гнездо, расположенное на толстом сучке кедра. В гнезде оказалось три птенца, один из которых выпорхнул, но тотчас упал на землю, так как почти совсем еще не мог летать. Ранее, в 1947 г. я нашел зяблика на гнездовье в окрестностях Сургута. До этого времени гнездование зяблика севернее Тобольска не было известно.

Aegialos caudatus caudatus L.—ополовник. Северная граница его прослежена неудовлетворительно и проводится приблизительно около 60° с. ш. ⁽¹⁾. Я нашел этот вид в значительном количестве в районе Ларьяка. Птицы наблюдались в июле в ивняках по р. Ваху. Добыто 4 экз. Можно с большой вероятностью предполагать, что указанное местонахождение, это еще не северный предел гнездового ареала данного вида.

Lanius collurio collurio L.—жулан. Этот вид найден мною в окрестностях Ларьяка в качестве обычной гнездящейся птицы. В первых числах августа много молодых жуланов наблюдалось на покосных лугах. Добыт один экземпляр взрослого самца. Севернее Тобольска жулан до сих пор не был указан. Под Сургутом мною ни разу не встречен.

Muscicapa striata neumanni Roche—серая мухоловка. В Западной Сибири этот вид известен до Енисейска ⁽¹⁾. Обычен в районе Тобольска, но севернее до сих пор не наблюдался. Мною найден в небольшом числе в районе нижнего и среднего течения р. Ваха. Мухоловки держались в небольших перелесках поймы. В конце июля молодые были уже самостоятельны. 1 августа добыт молодой экземпляр.

Acrocephalus arundinaceus arundinaceus L.—дроздовидная камышевка. Для Западной Сибири на гнездовье никем не указана. В Тобольском музее имеется экземпляр, добытый М. Д. Рузским 22 VIII 1896 г. близ озера Большого (55° 30' с. ш., б. Ишимский округ). Мною найдена в качестве обычной птицы в 20 км от Тюмени (оз. Тараскуль), где, несомненно, гнездится. Громкое пение самцов доносилось отовсюду из густых прибрежных зарослей

вейника. 20 июня 1953 г. добыт самец с сильно развитыми семенниками.

Acrocephalus dumetorum Blyth—садовая камышевка. Гнездится в небольшом количестве в районе Ларьяка, в кустарниках в пойме Ваха. Добыт один экземпляр 20 VII 1952 г. Под Сургутом гнездится в большом количестве (6). Для Западной Сибири северная граница садовой камышевки не была указана. На Енисее гнездится к северу до 62° с. ш. (1).

Sylvia borin Bodd.—славка садовая. Изредка наблюдалась мною в середине июля в районе нижнего течения Ваха. Самцы очень оживленно пели. В районе Ларьяка садовая славка не найдена. В небольшом числе гнездится под Сургутом, где мною в 1947 г. добыто несколько экземпляров. В районе Тобольска многочисленна. Северная граница садовой славки в Западной Сибири не была указана.

Turdus dauma varius Pall.—пестрый дрозд. В Западной Сибири, повидимому, редкий вид, судя по ограниченному числу находок. Последнее, может быть, объясняется крайней скрытностью птицы. Гнездование достоверно не установлено. Чаше всего попадались мертвые птицы, найденные осенью на улицах Тобольска и Тюмени. Дрозды, совершающие перелеты в сумерках, повидимому, разбивались о провода. В начале сентября 1940 г. во время охоты на рябчиков в 15 км от Тюмени я случайно застрелил пестрого дрозда, который на звук манка вылетел из чащи (с земли) и сел на нижний сучок ели. В этот момент я принял дрозда за рябчика. Птица была в свежем перье и настолько жирной, что нормально отпрепарировать ее не было возможности. 2 V 1946 г. в тех же местах я имел второй случай наблюдать пестрого дрозда. Рано утром, еще до восхода солнца из чащи молодого соснового леса доносился голос этой птицы, отдаленно напоминавший верещание вьюрка, но только более звонкое, близкое к протяжному посвисту.

Hirundo rustica rustica L.—деревенская ласточка. Этот вид прослежен мною к северу до с. Демьянского (около 59° с. ш.), где я в начале августа 1949 г. видел одну семью ласточек и покинутое гнездо. Птицы держались еще вместе, взрослые кормили молодых. Ни в Сургуте, ни в Ларьяке не встречены. На запад и восток от Западной Сибири деревенская ласточка распространена значительно дальше к северу: до 65° 30' с. ш. на Печоре и до 64° на Енисее (1).

Тюменский государственный
педагогический институт

Поступило
19 II 1954

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ С. А. Бутурлин, Г. П. Дементьев, Полный определитель птиц СССР, 4, 1937. ² Птицы Советского Союза (под редакцией Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова), 1, 1951. ³ Там же, 3, 1951. ⁴ Там же, 4, 1952. ⁵ И. Я. Словцов, Мат. к позн. фауны и фл. Росс. имп., в. 1 (1892). ⁶ А. Д. Шаронов, Некоторые результаты изучения фауны птиц в таежной зоне Западной Сибири, ДАН, 78, № 5 (1951).