

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Л. К. ГАБУНИЯ

**ОБ ОСТАТКАХ НОВОГО ВИДА DICROCERUS ИЗ МЕОТИЧЕСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ**

(Представлено академиком Е. Н. Павловским 20 VII, 1954)

Ископаемые олени, наряду с другими ископаемыми копытными, имеют важное значение для решения вопросов стратиграфии и палеогеографии. Поэтому заслуживает внимания новый представитель архаического рода оленей *Dicrocerus*, остатки которого были недавно найдены нами близ сел. Аркнети в слоях так называемой душетской свиты, относящихся скорее всего к меотису (возможно, к его верхней части).

Настоящее сообщение мы посвящаем краткому описанию указанных остатков *Dicrocerus*.

Dicrocerus salomeae sp. nov.

Голотип. Правый рог № 13 (рис. 1 на вклейке к стр. 256).

Местонахождение. Овраг в 1,5 км к северу от сел. Аркнети, Знаурского района, Юго-Осетинской автономной области.

Геологический возраст. Меотис (?).

Материал. Почти полный правый рог и левый роговой пенек с частью основания рога (№№ 13 и 14 коллекции Сектора палеобиологии АН Грузинской ССР).

Диагноз. *Dicrocerus* средних размеров. Пенек относительно короткий. Отличия между задним отростком (штангой) и глазным выражены слабо. Обе эти ветви рога служат как бы продолжением рогового пенька и расходятся под небольшим углом ($\sim 25^\circ$). Глазной отросток ответвляется на довольно значительном расстоянии от хорошо развитой розетки.

Описание. Рог принадлежит, повидимому, взрослому животному. Роговой пенек довольно короткий; в поперечном сечении имеет округлые очертания. Розетка хорошо развита, несет тесно расположенные округлые бугорки. Плоскость розетки по отношению к пеньку немного наклонена вперед, что связано со свойственным всем мунтжакам сильным наклоном пенька назад. Над розеткой тело рога начинает сильно уплощаться с боков и на расстоянии 46—57 мм от нее разветвляется. Характерной особенностью описываемого рога является то, что обе его ветви представляют как бы продолжение рогового пенька; при этом, хотя место ветвления рога расположено довольно высоко, деление его при помощи глубокого желобка на сравнительно более мощную заднюю ветвь, рассматриваемую нами как штангу, и переднюю, представляющую глазной отросток, следует тотчас же над розеткой. Поперечные сечения штанги и глазного отростка сверху постепенно принимают округлые очертания, а близ вершины становятся почти совершенно круглыми. Глазной отросток заметно короче и тоньше штанги. Задний край как у штанги, так и у глазного отростка — в средней части приостренный, килевидный. Верхние концы обеих ветвей рога слегка S-образно изогнуты. Глазной отросток

несколько отогнут наружу. Поверхность штанги и глазного отростка несет явственные желобки, по которым проходили сосуды.

Незначительный угол расхождения штанги и глазного отростка и ряд других признаков роговых пеньков и рогов заметно отличают описываемую форму от известных представителей *Dicrocerus*. В частности, от наиболее близкого к нему *D. furcatus* описываемый вид отличается менее высоким пеньком и гораздо меньшим углом расхождения заднего и глазного отростков. Большое сходство у *D. salomeae* в развитии обеих ветвей рога, штанги и глазного отростка, возможно, указывает на то, что, несмотря на относительно молодой геологический возраст, этот вид не отличался более высокой специализацией, чем типичные представители рода (*D. elegans* и *D. furcatus*), известные из среднемиоценовых отложений Западной Европы (2-4).

Промеры рогового пенька и рога: длина рогового пенька спереди ~ 46 мм; длина его сзади 25 мм; передне-задний поперечник его в середине 22 мм; наружно-внутренний поперечник его там же 20 мм; длина глазного отростка от розетки по внутренней стороне ~ 120 мм; передне-задний поперечник тела рога над розеткой 26 мм; наружно-внутренний поперечник тела рога там же 15 мм; расстояние от розетки до места деления рога ~ 46 мм; длина штанги от розетки по внутренней стороне ~ 150 мм; расстояние между концом глазного отростка и штангой (перпендикулярно к последней) ~ 43 мм; угол расхождения штанги и глазного отростка ~ 25°.

Присутствие представителя *Dicrocerus* в меотисе Южной Осетии, вероятно, указывает на облесенность рассматриваемой области и мягкий, влажный климат. О наличии в эту эпоху влажной обстановки в северо-западной части Восточной Грузии свидетельствуют и другие представители аркнетской фауны, среди которых преобладают антилопы с весьма низкими коронками зубов (1). Присутствие остатков *Dicrocerus* в меотисе Восточной Грузии интересно еще тем, что оно подтверждает существующие в литературе указания на довольно значительное вертикальное распространение этого рода, обычно считающегося характерным представителем среднемиоценовой фауны млекопитающих Западной Европы.

Сектор палеобиологии
Академии наук Груз.ССР

Поступило
23 VI 1954

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ Л. К. Габуния, Сообщ. АН Груз.ССР, 13, № 3 (1952). ² Ch. Depéret, Arch. Mus. Hist. Nat., Lyon, 4 (1887). ³ H. Filhol, Etudes sur les mammifères fossiles de Sansan, Paris, 1891. ⁴ O. Fraas, Die Fauna von Steinheim, Stuttgart, 1870.