Доклады Академии наук СССР
1955. Том 104, № 4

ЗООЛОГИЯ

А. С. ФЕТИСОВ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ЗАЩИТНО-КОРМОВЫХ СТАЦИЯХ САЯНСКОГО РЕЛИКТОВОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ (RANGIFER TARANDUS VALENTINAE FLER.) В СЕЛЕНГИНСКОЙ ДАУРИИ

(Представлено академиком Е. Н. Павловским 25 IV 1955)

На стыке горных хребтов Джидинского и Хамар-Дабана северный олень обитает сейчас в районе гольца Хасы-Эхэ-Ундур (2650 м абс. выс.). Восточнее этого гольца, в пределах Джидинского хребта, он отсутствует. В хребтах Большого и Малого Хамар-Дабана, следуя с запада на восток, южная и юго-восточная граница ареала простирается от верховьев рек: Цакира, Субутуя, Сангиной, Зусланы, Элотая, Самсалты и Левой Мишихи. Северная граница распространения проходит по долинам среднего течения рек: Переемной, Кедровой, Выдриной, Осиновки и низовьям Снежной, Лангатуя, Хара-Мурина, Солзана и Утулика. Западнее этих пунктов северный олень водится в верховьях Быстрой, Маргасана, Тульсуна и Харабарты. Основные места обитаний сосредоточены в районе гольцов: Орцака, Тыргина, Хара-Мурина, Самсалты, Переемного, Осиновского, Мамайского, Сохора, Мангылы, Алексеевского, Солзана и Бабки. Здесь он заходит на абсолютные высоты порядка 2200—2300 м.

Второй участок, занятый северным оленем, расположен в хребте Улан-Бургасы. Места обитаний сосредоточены в верховьях рек: Кики, Хаима, Курбы, Оны и Зазы. Олени концентрируются здесь главным образом у



Рис. 1. Географическое распространение Rangifer tarandus valentinae Flerov

гольцов: Дэдэ-Хурета, Бырхи-Шибирь, Бырки-Горхон и Малгылден. Отмечен единичный заход на левобережье Уды в район «Старой Курбы» (Худунский хребет).

В хребтах Маланском, Борщевочном, Черского и Даурском этот олень отсутствует.

В бесснежный период года защитно-кормовые стации северного оленя сосредоточены в полосе высокогорной тундры и субальпийских лугов, где оленьи тропы нередко обнаруживаются на склонах гор крутизной до 40—45°. Местами укрытий и лежек служат главным образом поляны среди заросшей кедрового стланника, золотистого рододендрона и кустарных ив. Летом олень часто отдыхает и на снеговых останцах. Во время летне-осенних буранов он спускается ниже, укрываясь в древесно-кустарниковых зарослях верхнего пояса леса. В зимнее время северные олени концентрируются в хвойных и смешанных лесах вблизи субальпийских лугов и на малоснежных участках гор (в местах «выдува»). Нередко они заходят в кедрово-пихтовые и лиственничные леса с обильным лишайниковым покровом. На субальпийских лугах и на участках высокогорной тундры описываемый олень поедает лишайники (Cladonia alpestre, C. silvatica, C. rangiferina, Cetraria islandica), тонконог (Koeleria altaica), мятлик (Poa ircutica, P. arctica), осоку (Carex brachylepis, C. canescens), шульцию (Schultia crinita), иву (Salix brachypoda, S. chlorostachya, S. baicalensis, S. reticulata), круглолистную березку (Betula rotundifolia), каллиантемум (Callianthemum isopyroides), ветреницу (Anemone crinita), василистник (Thalictrum alpinum), кровохлебку (Sanguisorba alpina), герань (Geranium albiflorum), сныть (Aegopodium alpestre), ветки черники (Vaccinium myrtillus), левзею (Leuzea carthamoides) и кипрей (Epilobium montanum, E. angustifolium).

Зимой на Хамар-Дабане, в верхнем поясе кедровой тайги отмечено поедание лишайников (Usnea barbata, U. longissima), веток ив (Salix myrtilloides), кустарных березок (Betula fruticosa, B. rotundifolia), жимолости (Lonicera coerulea), травяной ветоши из зонтичных, злаков (Calamagrostis sp.), лютиковых и розоцветных, хвоща (Equisetum hiemale), а также листьев бадана (Bergenia crassifolia). В единичном случае отмечено поедание опавших листьев осины и стеблей плауна (Lycopodium sp.). Содержимое зимних желудков северных оленей включало и мхи (большинство летних и частично зимних кормовых растений определено проф. В. И. Смирновым и Н. А. Еповой).

Местами водопоев служат не только таежные и подгольцовые речки, но и многочисленные каровые озера, окруженные субальпийскими лугами.

Северный олень в Селенгинской Даурии относится к наиболее малочисленным видам из всех семи видов копытных, населяющих эту часть Забайкалья. В хребте Улан-Бургасы сейчас насчитывается не более 250 голов. На Хамар-Дабане поголовье не превышает 400—450. Установлено, что медленный рост стада оленей происходит вследствие массовой гибели молодняка в период глубокоснежных зим. Об этом свидетельствуют находки погибших молодых оленей в районе гольцов Бырхи-Шибирь и Дэдэ-Хурета (Улан-Бургасы) в 1938 г. и в верховьях Солзана, Утулика, Дзымхи и Байги (Хамар-Дабан) в 1937 и 1940 гг.

Иркутский государственный университет
им. А. А. Жданова

Поступило
23 III 1955